CHAPITRE 5 COURBES PARAMÉTRÉES (EXEMPLES) 2024/2025

On considère $\mathbb{R}^3$ muni de son produit scalaire usuel et d'une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1 — Des asymptotes

On considère l'arc $\mathcal{A}$ défini par le paramétrage

$$\begin{cases} x(t) = t + \frac{1}{t} \\ y(t) = t + 1 + \frac{4}{t-1} \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

1.1 – Intervalle d'étude

Les fonctions x et y sont toutes deux continues sur $I_1 =]-\infty, 0[$, $I_2 =]0, 1[$, $I_3 =]1, +\infty[$. Il n'y a pas de symétrie apparente.

1.2 – Tableau de variations

x et y sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur leurs intervalles de définition.

$x'(t) = 1 - \frac{1}{t^2} = \frac{(t-1)(t+1)}{t^2}$, et $y'(t) = 1 - \frac{4}{(t-1)^2} = \frac{t^2 - 2t - 3}{(t-1)^2} = \frac{(t+1)(t-3)}{(t-1)^2}$, d'où le tableau de variations :

t	$-\infty$	-1	0	$ $	1	3	$+\infty$
$x'(t)$	$+$	0	$-$	$ $	$-$	$+$	$+$
$y'(t)$	$+$	0	$-$	$ $	$-$	0	$+$
$x(t)$	$-\infty$	$\nearrow -2$	$\searrow -\infty$	$ +\infty$	$\searrow 2$	$\nearrow \frac{10}{3}$	$\nearrow +\infty$
$y(t)$	$-\infty$	$\nearrow -2$	$\searrow -3$	$ +\infty$	$\searrow -\infty$	$\nearrow 6$	$\nearrow +\infty$

On en déduit immédiatement un point singulier en $t = -1$, une asymptote horizontale $y = -3$ en $t = 0$, une asymptote verticale $x = 2$ en $t = 1$, une branche infinie quand $t \rightarrow \pm\infty$, et un point à tangente horizontale en $t = 3$.

1.3 – Étude locale

En $\pm\infty$, $\frac{y(t)}{x(t)} \rightarrow 1$, et par ailleurs $y(t) - x(t) = t + 1 + \frac{4}{t-1} - t - \frac{1}{t} = 1 + \frac{3}{t} + o\left(\frac{1}{t}\right)$; il y a une asymptote oblique d'équation $y = x + 1$.

La courbe est au-dessus de l'asymptote en $+\infty$, et en-dessous en $-\infty$.

Pour étudier la nature du point singulier $M(-1)$, on peut poser $t = -1 + h$:

$$x(t) = -1 + h + \frac{1}{-1 + h} = -1 + h - (1 + h + h^2 + h^3 + o(h^3)) = -2 - h^2 - h^3 + o(h^3),$$

$$\text{et } y(t) = h + \frac{4}{-2 + h} = h - \frac{2}{1 - \frac{h}{2}} = h - 2 \left(1 + \frac{h}{2} + \frac{h^2}{4} + \frac{h^3}{8} + o(h^3) \right)$$

$$= -2 - \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{4} + o(h^3), \text{ et ainsi}$$

$$\overrightarrow{OM}(t) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{h^2}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{h^3}{4} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \delta(h^3), \text{ ce qui correspond à un point de rebroussement de première espèce de tangente dirigée par } -\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2 — La néphroïde – Tracé

On considère l'arc $\mathcal{N}$ défini par le paramétrage

$$\begin{cases} x(t) = 4 \cos^3 t \\ y(t) = \sin(3t) + 3 \sin t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

2.1 – Symétries, intervalle d'étude

x et y sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, et de plus elles sont toutes deux 2π -périodiques. Il suffit donc d'étudier $\mathcal{N}$ sur $[-\pi, \pi]$. De plus, $x(-t) = x(t)$ et $y(-t) = -y(t)$, donc $M(-t) : (x(t), -y(t))$ est l'image de $M(t) : (x(t), y(t))$ par une symétrie d'axe $y = 0$ (O_x). On peut donc se ramener à l'intervalle d'étude $[0, \pi]$.

Enfin, $x(\pi - t) = -x(t)$ et $y(\pi - t) = y(t)$, donc $M(\pi - t) : (-x(t), y(t))$ est l'image de $M(t) : (x(t), y(t))$ par une symétrie d'axe $x = 0$ (O_y). On peut donc se ramener à l'intervalle d'étude $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

2.2 – Tableau de variations

$x'(t) = -12 \cos^2 t \sin t$ et $y'(t) = 3 \cos(3t) + 3 \cos t = 6 \cos(2t) \cos t$, d'où le tableau de variations

t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$x'(t)$	0	$-3\sqrt{2}$	0
$y'(t)$	6	0	0
$x(t)$	4	$\sqrt{2}$	0
$y(t)$	0	$2\sqrt{2}$	2

2.3 – Étude des points singuliers

On constate que $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ est un point singulier, ainsi que son symétrique $M\left(-\frac{\pi}{2}\right)$. On étudie donc un développement limité de $M(t)$ en $\frac{\pi}{2}$:

$$M\left(\frac{\pi}{2} - h\right) = \begin{pmatrix} 4 \cos^3\left(\frac{\pi}{2} - h\right) \\ \sin\left(3\frac{\pi}{2} - 3h\right) + 3 \sin\left(\frac{\pi}{2} - h\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \sin^3 h \\ -\cos 3h + 3 \cos h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4h^3 + o(h^3) \\ 2 - 3h^2 + o(h^3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + h^2 \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + h^3 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{o}(h^3).$$

Il en résulte que ce point est un point de rebroussement de première espèce à tangente verticale.

3 — Enveloppe de droites

Soit la famille de droites $(\mathcal{D}_t)_{t \in \mathbb{R}}$: pour $t \in \mathbb{R}$, $(\mathcal{D}_t)_{t \in \mathbb{R}}$ passe par le point $M(t) : (4 \cos^3 t, \sin(3t) + 3 \sin t)$, et est dirigée par le vecteur $\vec{u}(t) : (\cos(2t), \sin(2t))$.

On sait que l'enveloppe de la famille $(\mathcal{D}_t)_{t \in \mathbb{R}}$ est paramétrée par $A(t) = M(t) + \lambda(t)\vec{u}(t)$ si, et seulement si,

$$\det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t)) \cdot \lambda(t) = -\det(\vec{M}'(t), \vec{u}(t)).$$

$$\text{Or } \det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t)) = \begin{vmatrix} -2 \sin(2t) & \cos(2t) \\ 2 \cos(2t) & \sin(2t) \end{vmatrix} = -2 \neq 0, \text{ et}$$

$$\vec{M}'(t) = \begin{pmatrix} -12 \cos^2 t \sin t \\ 6 \cos(2t) \cos t \end{pmatrix} = 6 \cos t \begin{pmatrix} -\sin(2t) \\ \cos(2t) \end{pmatrix}, \text{ donc}$$

$$\det(\vec{M}'(t), \vec{u}(t)) = 6 \cos t \begin{vmatrix} -\sin(2t) & \cos(2t) \\ \cos(2t) & \sin(2t) \end{vmatrix} = -6 \cos t;$$

$\lambda(t) = -3 \cos t$ et un paramétrage de l'enveloppe est

$$t \mapsto A(t) = M - 3 \cos t \vec{u}(t) = \begin{pmatrix} 4 \cos^3 t - 3 \cos t (2 \cos^2 t - 1) \\ \sin(3t) + 3 \sin t - 6 \sin t \cos^2 t \end{pmatrix}.$$

Après simplification, l'enveloppe est paramétrée par

$$\begin{cases} x_A(t) = 3 - 2 \cos^3 t \\ y_A(t) = 2 \sin^3 t \end{cases}.$$

4 — Base de Frenet, développée

On cherche à déterminer la base de Frenet, le rayon de courbure, et la développée de la néphroïde définie ci-dessus.

$$\text{Le vecteur dérivée en } M(t) \text{ est } \vec{M}'(t) = \begin{pmatrix} -12 \cos^2 t \sin t \\ 6 \cos(2t) \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \sin(2t) \cos t \\ 6 \cos(2t) \cos t \end{pmatrix} = 6 \cos t \begin{pmatrix} -\sin(2t) \\ \cos(2t) \end{pmatrix}.$$

Sur l'intervalle $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$, $\cos t > 0$ donc les points sont réguliers et

$$\frac{ds}{dt} = \|\vec{M}'(t)\| = 6 \cos t, \vec{T} = \begin{pmatrix} -\sin(2t) \\ \cos(2t) \end{pmatrix} \text{ et } \vec{N} = \begin{pmatrix} -\cos(2t) \\ -\sin(2t) \end{pmatrix}.$$

On continuera donc les calculs sur cet intervalle; sur l'intervalle complémentaire $\left] \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right[$, on peut raisonner par symétrie par rapport à O_y .

Par identification avec $\vec{T} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$, on trouve $\alpha = 2t + \frac{\pi}{2}$, donc $\frac{d\alpha}{dt} = 2$.

$$\text{Alors } R = \frac{ds}{d\alpha} = \frac{ds}{dt} \frac{dt}{d\alpha} = 3 \cos t.$$

Alors, un paramétrage de la développée est

$$t \mapsto I \rightarrow M + R \vec{N} = \begin{pmatrix} 4 \cos^3 t \\ \sin(3t) + 3 \sin t \end{pmatrix} - 3 \cos t \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2 \cos^3 t \\ 2 \sin^3 t \end{pmatrix}.$$

On retrouve le résultat obtenu ci-dessus (puisque la développée est l'enveloppe des normales).

5 — Épicycloïdes

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ un entier naturel non nul, et un cercle de centre O et de rayon p , autour duquel tourne sans glisser un cercle de rayon 1.

On appelle C le centre du cercle extérieur (celui qui tourne),

t l'angle de rotation de ce cercle (ainsi $t = \widehat{(\vec{i}, \overrightarrow{OC})}$),

P le point de contact des deux cercles, et P' le symétrique de P par rapport à C .

Comme le roulement se fait sans glissement, $\widehat{(\overrightarrow{CP'}, \overrightarrow{CM})} = p t$

donc $\widehat{(\vec{i}, \overrightarrow{CM})} = \widehat{(\vec{i}, \overrightarrow{CP'})} + \widehat{(\overrightarrow{CP'}, \overrightarrow{CM})} = p t + t = (p + 1)t$.

Alors un paramétrage de la courbe décrite par M est

$$t \mapsto \overrightarrow{OM}(t) = \begin{pmatrix} (p + 1) \cos t + \cos((p + 1)t) \\ (p + 1) \sin t + \sin((p + 1)t) \end{pmatrix}.$$

Cette courbe s'appelle **épicycloïde à p rebroussements**

(si $p = 1$, c'est une **cardioïde**; si $p = 2$, une **néphroïde**).

Sur l'intervalle $\left] -\frac{\pi}{p}, \frac{\pi}{p} \right]$, le vecteur dérivé est $\vec{M}'(t) = 2(p + 1) \cos \frac{pt}{2} \begin{pmatrix} -\sin \frac{(p + 1)t}{2} \\ \cos \frac{(p + 1)t}{2} \end{pmatrix}$, donc

$$\frac{ds}{dt} = 2(p + 1) \cos \frac{pt}{2} \text{ et } \vec{T} = \begin{pmatrix} -\sin \frac{(p + 1)t}{2} \\ \cos \frac{(p + 1)t}{2} \end{pmatrix}, \text{ et donc } \alpha = \frac{\pi}{2} + \frac{(p + 1)t}{2}.$$

On en déduit que $R = \frac{ds}{d\alpha} = \frac{ds}{dt} \frac{dt}{d\alpha} = 4 \frac{p + 1}{p + 2} \cos \frac{pt}{2}$, et que la longueur de l'épicycloïde sur l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{p} \right]$ est

$$\ell_0 = 2(p + 1) \int_0^{\frac{\pi}{p}} \cos \frac{pt}{2} dt = \frac{4(p + 1)}{p}, \text{ donc la longueur totale de l'épicycloïde est } \ell = 2p\ell_0 = 8(p + 1).$$

Un calcul un peu laborieux donne un paramétrage de la développée de l'épicycloïde, ce qui permet de montrer que cette développée est semblable à l'épicycloïde. Ci-dessous : l'épicycloïde et sa développée pour $p \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.