PT Exercices sur les matrices et déterminants (solutions) 2024/2025

feuille N° 2

1 On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Déterminer une base du noyau et de l'image de A. Ker(A) et Im(A) sont-ils supplémentaires?
- b) Mêmes questions concernant Ker(B) et Im(B).
- c) On considère la base de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$: $\mathcal{B} = (U, V, W) = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$.

Écrire la matrice de changement de base de la base canonique vers la base $\mathcal{B}$, puis écrire la matrice B' de l'endomorphisme canoniquement associé à B dans la base $\mathcal{B}$.

Réponse :

- a) Les colonnes de A engendrent Im(A), donc on obtient une base de Im(A) à l'aide d'un pivot de Gauss sur les colonnes de A :

$$A \underset{C}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \underset{C}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. A \text{ est de rang } 2, \text{ et } \text{Im}(A) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

D'après la formule du rang, Ker(A) est de dimension $3 - 2 = 1$. On peut déterminer une base de Ker(A) en résolvant le système $A.X = (0)$, ce qui peut se faire par pivot de Gauss sur les lignes de A :

$$A \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ ce qui correspond au système } \begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} : \text{Ker}(A) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Un pivot de Gauss sur $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, montre que **Ker(A) et Im(A) sont supplémentaires**.

- b) Si on appelle (C_1, C_2, C_3) les colonnes de A, celles de B sont $(C_1, C_1 - C_3, C_3) : \text{Im}(B) = \text{Im}(A)$. On peut déterminer une base de Ker(B) en résolvant le système $B.X = (0)$, ce qui peut se faire par pivot de Gauss sur les lignes de B :

$$B \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ ce qui correspond au système } \begin{cases} x + y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} :$$

$$\text{Ker}(B) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Puisque $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\text{Ker}(B) \subset \text{Im}(B)$ donc **Ker(B) et Im(B) ne sont pas supplémentaires**.

- c) La matrice de changement de base de la base canonique vers la base $\mathcal{B}$ est $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

On peut inverser P en complétant le pivot de Gauss sur les lignes de P, ou bien en résolvant le système $P \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$:

$$\begin{cases} 2x + y + z = a \\ -y = b \\ -x - y - z = c \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} 2x + z = a + b \\ y = -b \\ x + z = b - c \end{cases} \text{ puis } \begin{cases} x = a + b \\ y = -b \\ z = -a + b - 2c \end{cases}.$$

Alors $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. On trouve alors $B' = P^{-1}.B.P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

* **2** Soient A et B deux matrices de $M_n(\mathbb{C})$. On définit la matrice d'ordre $2n$: $M = \begin{pmatrix} A & A \\ A & B \end{pmatrix}$.

a) Déterminer le rang de M en fonction de ceux de A et $B - A$.

b) Montrer que M est inversible si et seulement si A et $B - A$ le sont et, dans ce cas, vérifier que

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} (B - A)^{-1} \cdot A^{-1} \cdot B & -(B - A)^{-1} \\ -(B - A)^{-1} & (B - A)^{-1} \end{pmatrix}$$

A Attention, A et B ne commutent pas forcément!

Réponse :

a) Les opérations de pivot de Gauss sur les lignes et sur les colonnes conservent le rang d'une matrice,

or : $M \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & B - A \end{pmatrix} \underset{C}{\sim} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B - A \end{pmatrix}$ donc $\boxed{\text{rg}(M) = \text{rg}(A) + \text{rg}(B - A)}$.

b) Ces mêmes opérations de pivot de Gauss sur les lignes et sur les colonnes (transvections) conservent le déterminant : $\det(M) = \det(A) \det(B - A)$ donc $\boxed{\det(M) \neq 0 \iff \det(A) \neq 0 \text{ et } \det(B - A) \neq 0}$.

Un calcul simple montre que $\begin{pmatrix} a & a \\ a & b \end{pmatrix}^{-1} = ((b - a)a)^{-1} \begin{pmatrix} b & -a \\ -a & a \end{pmatrix}$. On s'en inspire avec précaution

pour obtenir $\begin{pmatrix} A & A \\ A & B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A^{-1} \cdot B & -I \\ -I & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B - A & 0 \\ 0 & B - A \end{pmatrix}$ donc $\boxed{M^{-1} = \begin{pmatrix} (B - A)^{-1} \cdot A^{-1} \cdot B & -(B - A)^{-1} \\ -(B - A)^{-1} & (B - A)^{-1} \end{pmatrix}}$

3 Soit $n \in \mathbb{N}^*$, I_n la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et les matrices

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad A = I_n - N \quad \text{et} \quad B = I_n - J.$$

a) On appelle respectivement φ et ψ les endomorphismes respectifs canoniquement associés à N et J , et $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$:

Montrer que pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$: $\varphi^k(e_j) = 0$ si $1 \leq j \leq k$, et $\varphi^k(e_j) = e_{j-k}$ si $j > k$ et que $\psi^k(e_j) = e_{n+j-k}$ si $1 \leq j \leq k$, et $\psi^k(e_j) = e_{j-k}$ si $j > k$.

En déduire que $N^n = (0)$ et que $J^n = I_n$.

b) Soit M une matrice quelconque de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, montrer que $(I_n - M) \left(\sum_{k=0}^{n-1} M^k \right) = I_n - M^n$.

En déduire que $A = I_n - N$ est inversible, et préciser son inverse.

$B = I_n - J$ est-il inversible?

c) Soit a un réel, et la matrice

$$T = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 & \dots & a^{n-1} \\ 0 & 1 & a & a^2 & \dots & a^{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & a & \dots & a^{n-3} \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & a \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En remarquant que $T = \sum_{k=0}^{n-1} a^k J^k$, montrer que T est inversible et calculer son inverse.

Réponse :

a) $\varphi^k(e_1) = 0$, et $\varphi(e_j) = e_{j-1}$ si $j > 1$, ce qui montre la propriété au rang 1 (elle est claire au rang 0).

On procède ensuite par récurrence : si $\varphi^k(e_j) = 0$ pour $1 \leq j \leq k$, et $\varphi^k(e_j) = e_{j-k}$ pour $j > k$, alors $\varphi^{k+1}(e_j) = 0$ pour $1 \leq j \leq k$, $\varphi^{k+1}(e_k) = \varphi(e_1) = 0$, et pour $j > k + 1$, $\varphi^{k+1}(e_j) = \varphi(e_{j-k}) = e_{j-k-1}$ ce qui montre l'hérédité.

De même, $\psi(e_1) = e_{n+1-1}$, et $\psi(e_j) = e_{j-1}$ si $j > 1$, ce qui montre la propriété au rang 1 (elle est claire au rang 0).

On procède ensuite par récurrence : si $\psi^k(e_j) = e_{n+j-k}$ pour $1 \leq j \leq k$, et $\psi^k(e_j) = e_{j-k}$ pour $j > k$, alors $\psi^{k+1}(e_j) = e_{n+j-k-1}$ pour $1 \leq j \leq k$, $\psi^{k+1}(e_{k+1}) = \psi(e_1) = e_n = e_{n+k+1-k-1}$, et pour $j > k + 1$, $\psi^{k+1}(e_j) = \psi(e_{j-k}) = e_{j-k-1}$ ce qui montre l'hérédité.

En prenant $k = n$, on trouve $\varphi^n = 0$ et $\psi^n = \text{id}$, donc $N^n(0)$ et $J^n = I_n$.

b) $(I_n - M) \left(\sum_{k=0}^{n-1} M^k \right) = \sum_{k=0}^{n-1} M^k - \sum_{k=0}^{n-1} M^{k+1} = I_n + \sum_{k=0}^{n-1} M^k - \sum_{k=0}^{n-1} M^{k+1} - M^n = I_n - M^n$. En prenant $M = N$,

on trouve $(I_n - N) \left(\sum_{k=0}^{n-1} N^k \right) = I_n - M^n = I_n$ donc $A = I_n - N$ est inversible, et $A^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} N^k$.

En prenant $M = J$, on trouve $(I_n - J) \left(\sum_{k=0}^{n-1} N^k \right) = I_n - J^n = (0)$; $B = I_n - J$ n'est pas inversible.

c) $\sum_{k=0}^{n-1} a^k N^k$ est égal à T , et par ailleurs en prenant $M = aJ$: $(I_n - aJ).T = I_n - a^n N^n = I_n$ donc

T est inversible et $T^{-1} = I_n - aJ$.

* **4** On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

a) Déterminer les matrices $X \in M_2(\mathbb{R})$ telles que $AX = XA$, et celles vérifiant $BX = XB$.

b) Déterminer, dans la base $((1, -2, 1), (1, -1, 1), (-1, 1, 0))$, la matrice C' de l'endomorphisme γ défini par C dans la base canonique.

c) Déterminer les matrices $Y \in M_3(\mathbb{R})$ telles que $C'Y = YC'$, puis les matrices $X \in M_3(\mathbb{R})$ qui vérifient $CX = XC$. Indication : on pourra poser $X = P.Y.P^{-1}$.

Réponse :

a) Avec $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : A.X = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+c & 2b+d \end{pmatrix}, X.A = \begin{pmatrix} a+2b & 2a+b \\ c+2d & 2c+d \end{pmatrix} A.X - X.A = \begin{pmatrix} -2b+2c & -2a+2d \\ 2a-2d & 2b-2c \end{pmatrix}$

donc $A.X = X.A$ équivaut au système $(b = c, a = d)$; Les matrices $X \in M_2(\mathbb{R})$ telles que $AX = XA$ forment le plan vectoriel engendré par I_2 et $U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$B.X = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{pmatrix}, X.B = \begin{pmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{pmatrix}$, et $B.X - X.B = \begin{pmatrix} 2c & -2a+2d \\ 0 & -2c \end{pmatrix}$.

donc $B.X = X.B$ équivaut au système $(c = 0, a = d)$; Les matrices $X \in M_2(\mathbb{R})$ telles que $BX = XB$ forment le plan vectoriel engendré par I_2 et $U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

b) La matrice de passage vers la base est

$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, son inverse est $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Alors $C' = P^{-1}.C.P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

c) $C' = \text{diag}(2, 1, -1)$ est une matrice diagonale. Soit Y une matrice de colonnes (C_1, C_2, C_3) et de lignes L_1, L_2, L_3 , alors $C'.M$ a pour lignes $2L_1, L_2, -L_3$ et $M.C'$ a pour colonnes $(2C_1, C_2, -C_3)$.

Ces deux matrices ne peuvent être égales que si les coefficients non diagonaux de M sont nuls, c'est-à-dire si M est diagonale.

Avec $X = P.Y.P^{-1}$, $CX = XC$ équivaut à $C.P.Y.P^{-1} = P.Y.P^{-1}.C$ donc en multipliant à droite par P et à gauche par $P^{-1} : P^{-1}.C.P.Y = Y.P^{-1}.C.P : C'Y = YC'$. On est ramené à la question précédente, c'est-à-dire $Y = \text{diag}(a, b, c)$ c'est-à-dire $X = P.\text{diag}(a, b, c).P^{-1}$.

5 Calculer les déterminants suivants, sous forme aussi factorisée que possible :

a) $\begin{vmatrix} a\alpha + b\gamma & a\beta + b\delta \\ c\alpha + d\gamma & c\beta + d\delta \end{vmatrix}$ **b)** $\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{vmatrix}$ **c)** $\begin{vmatrix} a+b & ab & a^2+b^2 \\ b+c & bc & b^2+c^2 \\ c+a & ca & c^2+a^2 \end{vmatrix}$ **d)** $\begin{vmatrix} x & a & b & y \\ a & x & y & b \\ b & y & x & a \\ y & b & a & x \end{vmatrix}$

Réponse : a) Remarquons que $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\alpha + b\gamma & a\beta + b\delta \\ c\alpha + d\gamma & c\beta + d\delta \end{pmatrix}$; en passant au déterminant :

$$\begin{vmatrix} a\alpha + b\gamma & a\beta + b\delta \\ c\alpha + d\gamma & c\beta + d\delta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = (ad - bc)(\alpha\delta - \beta\gamma).$$

b) $D_b = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{vmatrix} = -abc + abc = 0$ (Sarrus). On peut aussi remarquer que $D_b = \det(B)$ avec $B^T = -B$,

donc $\det(B) = \det(B^T) = (-1)^3 \det(B) = -\det(B)$ donc $D_b = \det(B) = 0$.

$$\begin{aligned} \text{c) } D_c & \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \\ = \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \end{matrix} \begin{vmatrix} b-c & a(b-c) & (b-c)(b+c) \\ b-a & c(b-a) & (b-a)(b+a) \\ c+a & ca & c^2+a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(b-c) \begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & c & b+a \\ c+a & ca & c^2+a^2 \end{vmatrix} \\ & = (b-a)(b-c) \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \\ = \\ C_2 \leftarrow C_2 + C_3 \end{matrix} \begin{vmatrix} 0 & a-c & c-a \\ 1 & c & b+a \\ c+a & ca & c^2+a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-b)(c-a) \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & c & b+a \\ c+a & ca & c^2+a^2 \end{vmatrix} \\ & = (b-a)(c-b)(c-a) \begin{matrix} C_2 \leftarrow C_2 + C_3 \\ = \\ \text{a) } \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & a+b+c \\ c+a & c^2+a^2+ca \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Or $\begin{vmatrix} 1 & a+b+c \\ c+a & c^2+a^2+ca \end{vmatrix} = c^2+a^2+ca - (a+c)^2 - b(a+c) = -ac - bc - ba$ donc

$$D_c = (b-a)(c-b)(c-a)(ab+bc+ca).$$

$$\begin{aligned} \text{d) } D_d & \begin{matrix} C_1 \leftarrow C_1 - C_4 \\ = \\ C_2 \leftarrow C_2 - C_3 \end{matrix} \begin{vmatrix} x-y & a-b & b & y \\ a-b & x-y & y & b \\ b-a & y-x & x & a \\ y-x & b-a & a & x \end{vmatrix} \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \\ = \\ L_4 \leftarrow L_4 + L_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} x-y & a-b & b & y \\ a-b & x-y & y & b \\ 0 & 0 & x+y & a+b \\ 0 & 0 & a+b & x+y \end{vmatrix} \\ D_d & = \begin{vmatrix} x-y & a-b \\ a-b & x-y \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x+y & a+b \\ a+b & x+y \end{vmatrix} = ((x-y)^2 - (a-b)^2)((x+y)^2 - (a+b)^2) \quad \text{donc} \end{aligned}$$

$$D_d = (x-y+a-b)(x-y-a+b)(x+y+a+b)(x+y-a-b).$$

** **6** Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$, et $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, on considère les déterminants de taille n :

$$P_n(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & x \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad \Delta_n(a, b) = \begin{vmatrix} b & a & \cdots & a \\ a & b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ a & \cdots & a & b \end{vmatrix}.$$

- a) Calculer $P_2(x)$ et $P_3(x)$.
- b) Dans $P_n(x)$, effectuer les opérations de pivot de Gauss : $C_j \leftarrow C_j - C_n$ pour $1 \leq j \leq n-1$, puis mettre en facteur $(x-1)$ dans les $n-1$ premières colonnes, puis $L_i \leftarrow L_i + L_{i-1}$ pour $2 \leq i \leq n$; en déduire la valeur de $P_n(x)$, sous forme factorisée.
- c) En déduire la valeur de $\Delta_n(a, b)$ sous forme factorisée.
- d) On considère la matrice $K_n \in M_n(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1. Montrer que $K_n^2 = n.K_n$, puis déterminer l'inverse de la matrice $M = (b-a)I_n + aK_n$ sous la forme $xI_n + yK_n$.

Réponse :

a) $P_2(x) = \begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = x^2 - 1$ et $P_3(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)^2(x + 2)$.

b) $P_n(x) = \begin{vmatrix} x-1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1-x & x-1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1-x & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & x-1 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1-x & x \end{vmatrix} = (x-1)^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x \end{vmatrix}$

$P_n(x) = (x-1)^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & x+(n-1) \end{vmatrix} \quad \boxed{P_n(x) = (x-1)^{n-1}(x+(n-1))}$

c) Si $a = 0$, alors $\Delta_n(a, b) = b^n$; supposons alors $a \neq 0$.

Comme le déterminant est multilinéaire, on peut mettre a en facteur dans chaque colonne, et

$\Delta_n(a, b) = a^n P_n\left(\frac{b}{a}\right) = a^n \left(\frac{b}{a} - 1\right)^{n-1} \left(\frac{b}{a} + (n-1)\right) = (b-a)^{n-1}(b+(n-1)a)$, valeur juste même si

$a = 0$: $\boxed{\Delta_n(a, b) = (b-a)^{n-1}(b+(n-1)a)}$.

d) Les coefficients de K_n sont tous égaux à $\sum_{k=1}^n 1 = n$, donc $K_n^2 = n.K_n$.

Alors $M.(xI_n + yK_n) = ((b-a)I_n + aK_n)(xI_n + yK_n) = x(b-a)I_n + (ax + (b-a)y)K_n + ayK_n^2 = x(b-a)I_n + (ax + (b-a)y + nay)K_n$.

Comme (K_n, I_n) forme un système libre, ceci n'est égal à I_n que si $\begin{cases} x(b-a) & = 1 \\ ax + (b+(n-1)a)y & = 0 \end{cases}$

Si $a \neq b$ et $(n-1)a \neq -b$, (c'est-à-dire $\det(M) \neq 0$), ce système a une solution unique

$(x, y) = \left(\frac{1}{b-a}, \frac{-1}{(b-a)(b+(n-1)a)}\right)$ donc $\boxed{M^{-1} = \frac{1}{b-a}I_n - \frac{1}{(b-a)(b+(n-1)a)}K_n}$.

* **7** Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$, et $(a, b, c) \in \mathbb{K}^2$, ($a \neq c$) on considère le déterminant de taille n :

$$Q_n(x) = \begin{vmatrix} b+x & a+x & \cdots & a+x \\ c+x & b+x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a+x \\ c+x & \cdots & c+x & b+x \end{vmatrix}.$$

- a) En effectuant les transformations $C_m \leftarrow C_m - C_1$, $2 \leq m \leq n$, montrer que Q_n est un polynôme de $\mathbb{K}_1[X]$.
- b) En écrivant $Q_n(x) = \alpha_n x + \beta_n$, et en utilisant les valeurs de $Q_n(-a)$ et de $Q_n(-c)$, déterminer une expression de β_n en fonction de n, a, b et c et en déduire une expression de $Q_n(0)$.

Réponse :

a) Les coefficients de $C_m - C_1$ sont constants. On conclut par linéarité par rapport à la première colonne.

b) $Q_n(-a) = (b-a)^n$ et $Q_n(-c) = (b-c)^n$ donc α_n et β_n vérifient le système $\begin{cases} -\alpha_n a + \beta_n = (b-a)^n \\ -\alpha_n c + \beta_n = (b-c)^n \end{cases}$.

On trouve $\alpha_n = \frac{(b-c)^n - (b-a)^n}{a-c}$ et $\beta_n = \frac{a(b-c)^n - c(b-a)^n}{a-c}$

donc $Q_n(0) = \beta_n = \frac{a(b-c)^n - c(b-a)^n}{a-c}$.

* **8** **Déterminants de Vandermonde**

On considère n nombres complexes $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$), et pour $p \in \{2, \dots, n\}$, on pose :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_p) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{p-1} & a_p \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_{p-1}^2 & a_p^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1^{p-1} & a_2^{p-1} & \cdots & a_{p-1}^{p-1} & a_p^{p-1} \end{vmatrix} \text{ et } P_{p-1}(X) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{p-1} & X \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_{p-1}^2 & X^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1^{p-1} & a_2^{p-1} & \cdots & a_{p-1}^{p-1} & X^{p-1} \end{vmatrix}.$$

On pose par ailleurs $V(a_1) = 1$, et $P_1(X) = X - a_1$.

- a) S'il existe un couple d'entiers (i, j) tels que $1 \leq i < j \leq p$ et $a_i = a_j$, montrer que $V(a_1, \dots, a_p) = 0$.
Si les a_i sont distincts, montrer que $P_{p-1}(X)$ est un polynôme de $\mathbb{R}_{p-1}[X]$, de racines $a_1, a_2, \dots, a_{p-1}$ et de coefficient dominant $V(a_1, a_2, \dots, a_{p-1})$.
En déduire que *dans tous les cas* $V(a_1, a_2, \dots, a_p) = (a_p - a_1)(a_p - a_2) \dots (a_p - a_{p-1})V(a_1, a_2, \dots, a_{p-1})$.

b) Montrer que $V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$.

c) Calculer les déterminants $((a, b, c) \in \mathbb{R}^3)$:

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos a & \cos(2a) \\ 1 & \cos b & \cos(2b) \\ 1 & \cos c & \cos(2c) \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a^{-1} & a & a^3 \\ b^{-1} & b & b^3 \\ c^{-1} & c & c^3 \end{vmatrix}$$

Réponse :

a) Supposons qu'il existe un couple d'entiers (i, j) tels que $1 \leq i < j \leq p$ et $a_i = a_j$, alors les $i^{\text{ème}}$ et $j^{\text{ème}}$ colonnes sont égales, donc $V(a_1, \dots, a_p) = 0$.

Si les a_i sont distincts, alors $(a_1, a_2, \dots, a_{p-1})$ sont $p-1$ racines distinctes du polynôme $P_{p-1} \in \mathbb{R}_{p-1}[X]$. Par développement par rapport à la dernière colonne, on constate que le terme dominant de $P_{p-1}(X)$ est $V(a_1, a_2, \dots, a_{p-1})$.

Un théorème sur les polynômes (unicité si le polynôme est scindé à racines simples et à coefficient dominant donné) permet de montrer que $P_{p-1}(X) = V(a_1, a_2, \dots, a_{p-1}) \prod_{k=1}^{p-1} (X - a_k)$.

Si les (a_k) sont distincts, l'égalité $V(a_1, a_2, \dots, a_p) = (a_p - a_1)(a_p - a_2) \dots (a_p - a_{p-1})V(a_1, a_2, \dots, a_{p-1})$ est obtenue en prenant $X = a_p$.

Dans les cas contraire, $V(a_1, a_2, \dots, a_p) = 0$ et l'un des facteurs $(a_p - a_1)(a_p - a_2) \dots (a_p - a_{p-1})$ ou $V(a_1, a_2, \dots, a_{p-1})$ est nul, donc la formule reste vraie.

b) On peut alors montrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que $\mathcal{H}_n : V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$.

$\mathcal{H}_2 : V(a_1, a_2) = a_2 - a_1$ est facile à montrer (on peut également convenir que $V(a_1) = 1 = \prod_{\emptyset} (a_j - a_i)$).

Le passage de $\mathcal{H}_n$ à $\mathcal{H}_{n+1}$ (hérédité) est une conséquence de la propriété vérifiée dans la question précédente.

c) On vérifie que $\cos(2x) = 5 = 2 \cos^2 x - 1$. Par des opérations de pivot de Gauss sur les colonnes ($C_3 \leftarrow C_3 + C_1$, puis mise en facteur de 2 sur C_3) on obtient

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos a & \cos 2a \\ 1 & \cos b & \cos 2b \\ 1 & \cos c & \cos 2c \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & \cos a & \cos^2 a \\ 1 & \cos b & \cos^2 b \\ 1 & \cos c & \cos^2 c \end{vmatrix} = V(\cos a, \cos b, \cos c) = (\cos c - \cos b)(\cos c - \cos a)(\cos b - \cos a).$$

Par mise en facteur de $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ et $\frac{1}{c}$ respectivement dans la première, deuxième, troisième ligne :

$$\begin{vmatrix} a^{-1} & a & a^3 \\ b^{-1} & b & b^3 \\ c^{-1} & c & c^3 \end{vmatrix} = \frac{1}{abc} \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^4 \\ 1 & b^2 & b^4 \\ 1 & c^2 & c^4 \end{vmatrix} = V(a^2, b^2, c^2) = (c^2 - a^2)(c^2 - b^2)(b^2 - a^2) = (c - a)(c - b)(b - a)(c + a)(c + b)(b + a).$$